

LAXATIVES

بسم الله الرحمن الرحيم

- Lactulose** (syrup) صغيرة 5 £E ملعقة 3 مرات يومياً
- Picolax** (drops) 2£E الحامل و الأطفال 10 نقط يومياً
- Enemax**
- Glycerin** (supp) Ad , PED 1£E **للرضع**
- Laxel** (eff) 3£E
- Nassar** (tab) 1.5£E
- Prostigmine** (tab) 3£E لضعف حركة الأمعاء

الإسهال

- Antinal** (cap , susp) 5£E قرص 3 مرات يومياً
- Flagyl** (susp , tab) 6£E قرص 3 مرات يومياً لمدة 7 أيام
- Entocid - H** (tab) للإسهال مع المغص
- Furazol** (susp , tab) 7 أيام ملعقة 3 مرات أو قرصين كل 8 ساعات 7 أيام

الإسهال عند الرضع

- kapect susp ملعقة 3 مرات يومياً
- smecta ½ كيس على 10 سم ماء
- spasmotal drops 3 مرات يومياً
- Rehydrane packet
- كيس على 200 مل ماء يعطي 15 مل بعد كل مرة إسهال

الإسهال البكتيري في الأطفال (إسهال الصيف):

- Septazole susp ملعقة كل 12 ساعة بعد الأكل
- Antinal susp ملعقة 3 مرات بعد الأكل
- Pyral syrup 3 مرات يومياً
- Visceralgine syrup 3 مرات قبل الأكل

عسر الهضم

- Spasmo amrase** (tab)
- Spasmodigestin** (tab)
- Zymogen forte** (tab)

Irritable bowel syndrome:

- Brane tab قرصين 3 مرات يومياً قبل الأكل بنصف ساعة
- Librax قرص 3 مرات يومياً (علبة واحدة)
- Colona قرص 3 مرات قبل الأكل بنصف ساعة
- Spasmoamrase قرص 3 مرات بعد الأكل

الانتفاخ

- Primperoxane** (tab) 3£E
- Disflaty** (tab)
- Mentothicone** (cap)
- Meteospasmyl** (cap) 13£E

المغص والانتفاخ عند الأطفال:

- Visceralgin syrup عند اللزوم
- Simethicone susp ملعقة 3 مرات
- Postine digestive syrup ملعقة كبيرة 3 مرات
- المغص و الانتفاخ عند الرضع:
- Gripe water syrup ½ ملعقة 3 مرات

إضطرابات

القولنج

Colona (tab) 10LE

Tritone (tab) 1x3

المغص

Visceralgin (syrup) 1x3

Buscopan Plus (tab)

Spasmofen (amp)

: للأطفال و الرضع

Baby quiet (syrup)

Baby rest (drops)

Spasmotal (drops)

Renal, biliary drugs

Oxalate \Rightarrow in urine analysis :

Epimag (sachets) كيس علي نصف كوب ماء 3 مرات يوميا

Lower UTI :

Uvamin (mild) (cap) 10LE كبسولة كل 6 ساعات لمدة 5 أيام

UTI : Noracin 400 (severe*) (10 tab) 18 LE قرص كل 12 ساعة يعد الأكل لمدة 7 أيام

*severe if pus cells > 30 /HPF

القيء والغثيان

Cortigen B6 (amp) ad, ped 4 LE

Vomistop (cap) قرص قبل النوم أو عند اللزوم

Primperan (Tab, amp) قرص قبل الأكل بنصف ساعة 3 مرات يوميا

(hiccup)

: للحمل

Ezadoxine قرص قبل النوم

Dizirest B 6 (1st 3 Months)

*Dramenex (sultan) (cap) لدوار البحر و الترجيع والغثيان عند المسافرين قرص 3 مرات يوميا

الحموضة

Renal colic :

Spasasmfen amp

Uricol كيس علي نصف كوب ماء

Rowatinex cap كبسولتين 3 مرات قبل الأكل

Epicogel (*mucogel*) (susp) ملعقة كبيرة 3 مرات يومياً مضاد للإنتفاخ
 Zantac (tab) (300 1x1 , 150 1x2) (20LE) للحموضة مرة واحدة
 Ranitidine (أرخص)
 Famotin 20mg (tab) for recurrence مرة واحدة ليلاً

Peptic ulcer :

Omepral (cap) كبسولة قبل الأكل مرة واحدة يومياً لمدة شهر
 Conaz (10tab) 16LE قرص 3 مرات يومياً
 Gastrofai 500 , 1000 (tab) قبل الفطار والعشاء

Peptic ulcer for 2 w :

Omepral cap 4w كبسولة مرة واحدة يومياً قبل العشاء
 Claribiotic 500 cap كبسولة كل 12 ساعة
 Amrizole قرص كل 12 ساعة

الديدان

*البلهارسيا :

Distocide 600 mg (tab) during meals 20-40mg/kg 1 or 2 doses

*Tinea saginata & soleum H nana :

Yomesan (mirazid cap)

أقراص للمضغ تمضغ جيداً ثم تبلع بالماء في اليوم الأول أربع أقراص مرة واحدة ثم قرصين يومياً لمدة أسبوع ويؤخذ laxel فوار
 بعد ذلك كيس علي نصف كوب ماء 3 مرات يومياً

Bendax (tab 200mg , susp 100mg/5ml

قرصين مرة واحدة و strongyloidiasis , taeniasis قرصين مرة واحدة يومياً لمدة 3 أيام أو 20 مل من زجاجة 30 مل مرة واحدة يومياً ممكن يكرر بعد أسبوعين ثم أربعة

Fluvermal (susp) ملعقة كل 12 ساعة لمدة 3 أيام ممكن يكرر بعد أسبوعين ثم أربعة

Antiver قرص مرتين يومياً لمدة 3 أيام لا يؤخذ في الحمل

Hyperuricaemia & gout

Chronic :

Zyloric (allopurinol) 100 , 300 mg (tab) 800-200 مجم علي جرعتين

Acute:

Urosolvine (cholchicine) (eff) 1x3 not with NSAIDs & renal and hepatic pts

Common cold

Night & Day (tab) 1 x 2

Cafamol (tab) 1 x 2

Congestal syrup

البرد عند الأطفال :

Rhinostop drops 1x3
 Curisafe 250 susp 1 / 12h
 megafen syrup 1x3

البرد عند الرضع :

Otrivin baby saline drops 2x3
 Curisafe 100 drops 1 / 12h
 Cetal drops , syrup 1x3

Cough

Dry:

Codilar , sinecod (syrup)

Tuscapine (syrup)

Wet:

Bronchophan, Ventoline Expect , Guava Trix (syrup)

BroZedex (syrup)

Tuskan (syrup)

Bronchial Asthma

O₂ 40-60 %

Stage I :Nebulizer

2ml Normal Saline + 0.25 mg Atrovent (Ipratropium Bromide) + 2.5 mg

Farcoline (salbutamol) NB: IF 2 amp greater improvement

Stage II :Infusion:

Glucose 5% + Solu-cortef (vial) (hydrocortisone 100mg)+ amp minophylline + Bisolvon (amp)

STAGE III: inbetween attack:

1- Clenil (inhaler) 2 بخة صباحاً و 2 بخة مساءً

2 - Quibron (tab) ½ قرص كل 12 ساعة وتشرب سوائل كثير

Bricanyl (syrup) للحمل

Anti Histaminic

Fenistil (tab , syrup)

Avil amp , tab , syrup

Topical:

Allergex (cream) 1.5% 1x2

Non sedative

For Insect bite – urticaria – eczema – angioedema – food & drug allergy - allergic rhinitis – allergic conjunctivitis

Allerfen (60, 180 tab)

Claritine (Tab 10 , Syrup 5) قرص مرة واحدة يومياً

Corticosteroid

Epidron (vial) حقنة عضل مرة أو أكثر حسب الحاجة

الكحة الجافة :

Codilar (sinecod) syrup

1½ ملعقة كبيرة 3 مرات بعد الأكل

Ventoline 2mg tab

قرص 3 مرات بعد الأكل

Vendexine syrup

ملعقة كبيرة مرتين يومياً بعد الأكل لمدة 3 أيام

الكحة المصحوبة بلغم :

Mucophylline syrup

1½ ملعقة كبيرة 3 مرات بعد الأكل

Vendexine syrup

ملعقة كبيرة بعد الأكل مرتين يومياً لمدة 3 أيام

الآزمة في الأطفال :

Minophylline ped .supp. لبوسة كل 12 ساعة

Zaditen syrup ملعقة كل 12 ساعة لمدة 6 شهور

Bisolvon drops نقط 3 مرات يومياً بعد الأكل

Apidone syrup ملعقة 3 مرات يومياً لمدة 5 أيام ولا يكرر

Diprofos (amp) 15LE kenacort (vial) عضل مرة واحدة فقط

Apidone (syrup) (dexta & chlorpheniramine) للأطفال ¼ ملعقة 3 مرات للأكبر ½ ملعقة 3 مرات ولل كبار ملعقة 3 مرات

Sexual

Vivecta

Vigadol

مخدر موضعي:

Spearmint (spray)

: للآلام الجماع للمرأة

KY gel

: لبناء العضلات

Decadurabolin (25-50) amp weekly

Vitamins

Biovit 12 (amp) (macrocytic anaemia) حقنة كل أسبوع في أول شهرين ثم كل شهر لمدة 3 شهور

Erthropiotin (vial) 37LE (anaemia in RF) حقنة 1-3 مرات أسبوعياً

Neurobion (amp) حقنة كل أسبوع لإلتهاب الأعصاب في كبار السن والسكر

Activate 200 (tab) قرصين بعد الفطار مقوللذاكرة

Vit D D3 natural 4500 (drops)

Ginseng GK 850 (Cap) JOKAR 1200 (Cap) Ginkor forte (cap)

:فيتامينات للرضع

Bebe vit (drops) ½ droper once daily

: للأطفال

Vitamount (syrup) ملعقة 3 مرات يومياً قبل الأكل

LMCO seas (syrup) للوقاية من الكساح (زيت كبدة الحوت) ملعقة 3 مرات يومياً

: للكبار

Supravit

Viterra plus (فايزر) 6 LE

Vitamax plus (جلاكسو) كبسولة مرة واحدة بعد الفطار (cap)

Vitona plus (36 compound)

Vivamax 3 (Cap) تنظيم الساعة البيولوجية قرص قبل النوم

: فاتح للشهية

Tres - Orix Forte (Syrup) ملعقة 3 مرات قبل الأكل بنصف ساعة

: بناء الأجسام

Weight gainer (powder) للأطفال ملعقة علي كوب لبن وللکبار ملعقتين علي كوب لبن 3مرات يوميا

الأنيميا ونقص الكالسيوم

Osteoporosis

Evista 60 (tab) نقص الكالسيوم (النمو والتسنين والحمل والرضاعة والياس والغسيل الكلوي ولين العظام)

Calcium Sedico (eff) (Ca, D, C) كيس فوار مرة واحدة بعد الأكل

FerroCal (cap) (Ca, D, C, Iron, Zn, Folic acid) once daily

Iron deficiency anaemia

Haemoton (cap) GSK 10 LE 1-2 كبسولة مرة واحدة يوميا يناسب الحمل

Obron (40cap) pfizer 6LE لمنع الأنيميا أثناء الحمل كبسولة مرة واحدة يوميا

Fefol (cap) (ferrous sulfate) once daily

لو فشل oral بعد 4-6 شهور نستخدم parenteral مثل jectofar

المسكنات

: للأطفال

Megafen (syrup) (pa+ibu) 2.75 LE 3 مرات يوميا

Brufen (syrup) 4.5LE 3X1

Novacid (syrup) 2 LE

egaskineV (supp)

Dolphin-K drops & Supp 1x1

: للکبار

Parofen (30tab) 7.5LE (pa500+ibu400) قرص 3 مرات يوميا

DolphinK (amp) 6LE حقنة كل 12 ساعة

Cataflam 25 / 50 (10cap) 9LE كبسولة كل 12 ساعة

Indocid (cap & vial) كبسولة 3 مرات يوميا

Orudis & ketolgin amp حقنة كل 12 ساعة

mexicam & Anti cox II (7.5&15) (Cap & amp & supp) مرة واحدة بعد الأكل

: المسكنات بروشتة

Acupan (tab & amp) قرص 3 مرات / حقنة 4 مرات

Nalufin (amp) إلى 4 حقن وريد ببط أو تحت الجلد أو عضل

Tramadol (amp) (n't in renal & hepatic pts)

Pethidine 50 & 100 (amp)

ANTAGONIST:

Naloxone (amp) 1-5 أمبول كل 3 دقائق حتى التحسن أو 10 مجم

Muscle relaxant

Myolgin (20 cap) 10 LE كبسولة 3 مرات يومياً

Dimra (tab)

Myolastan (tab) 18 LE لتقلص العضلات الشديد

Antibiotic

للأطفال:

Ibidroxil , Curisafe 125, 250 (drops 100, susp) 8 LE ملعقة كل 12 ساعة

Cefotax 250, 500 (vial) 6 LE حقنة كل 12 ساعة

Flumox 250, 500 (susp, vial) كل 6 ساعات

E-mox 125, 250 4.5 LE ملعقة كل 8 ساعات

Hibiotic 156, 312 15 LE (susp) ملعقة كل 8 ساعات

Seprin (Susp) ملعقة كل 12 ساعة

Erythrocin (susp) في حساسية البنسيلين / ملعقة كل 6 ساعات

الحمل:

Ceporex (125, 250, 500, 1000) (Tab 15 LE, vial 8 LE susp 10 LE) كل 6 ساعات

Cephotox (vial) كل 12 ساعة

Flumox

Emox (Cap, vial) كبسولة كل 8 ساعات

Ampicillin

الكبار:

Cefotax 1000 (vial) حقنة عضل أو وريد كل 12 ساعة

Ibidroxil 500 Cap 6 LE, 1000 Tab 9 LE كبسولة كل 12 ساعة

Flumox 500, 1000 (16 cap 12 LE, vial 6 LE) كبسولة أو حقنة كل 6 ساعات

Seprin & sutrim & Septazole Forte (tab) قرص كل 12 ساعة

Curisafe cap 1x12

Angina

During attack:

Angised 0.5 (tab) قرص تحت اللسان ويكرر لعدد 3 أقراص كل 10 دقائق وإلا يُحول للمستشفى لـ MI

Inbetween attack:

1 - Nitrocare SR 2.5, 6.5, 9 (cap) كبسولة 3 مرات يومياً

2- Isoptin (tab) قرص 3 مرات يومياً

Hypertension

< 55 y or not black	>55 y or black
<u>ACE</u> Capoten 25, 50 (tab) 10 £E قرص مرتين يومياً قبل الأكل بساعة Enalapril 5, 20 (tab) 17£E قرص مرة واحدة يومياً ± <u>β Blocker</u> : Ateno 50, 100 (tab) 3£E قرص مرة واحدة مساءً	<u>CCB:</u> Isoptin 80 (tab) 6-1 أقراص مرتين يومياً Epilat 10, 30 (cap) 5£E قرص 3 مرات يومياً تفرش ثم تبلع في الطوارئ ± <u>Diuretic</u> : Aldactazide (tab) قرص مرة واحدة يومياً Moduretic (Tab) 1- ½ قرص يومياً أو يوم بعد يوم

In Emergency :

If systolic is high **Lasix** 40 (5amp) 3 £E يستحسن من غير محلول

If diastolic is high **Epilat** كبسولة تحت اللسان

الحمل :

Aldomet 250 (tab) قرص مرتين يومياً

hypotension

Hypotension:: sever cases give amp dexamethasone

Effortil (tab 5, drops 7.5) 4£E 10 نقط 3 مرات يومياً

Gutron (tab, drops) 5£E قرص 3 مرات قبل الأكل

Orthostatic Hypotension:

Fall in S ≥ 20 , D ≥ 10 (ask for ; blood sugar , urea , Hb) standing $\frac{-10}{+10}$
Astonin H (20 tab) 5£E قرص مرة واحدة قبل الأكل

منشط للدورة الدموية :

Stugeron 25 tab 11 £E قرص صباحاً وقرص مساءً

+ **Trental** tab قرص صباحاً وقرص مساءً

+ **Ginkor forte** (cap) 22 LE كبسولة 3 مرات بعد الأكل

Meniere:

Betaserc 8, 16 tab قرص 2-3 مرات يومياً

+ **Vascular** cap كبسولة كل 12 ساعة بعد الأكل

: لوقف النزيف

Konakion 5 amp 35LE حقنة عضل كل 12 ساعة

: لتصريف الكدمات

Alphintern 20 tab 12LE قرص مرتين يومياً

: منشط لأداء المخ

Nootropil (200 syrup, 400 cap, 800 tab, 1000 amp) 12LE 2-3 مرات يومياً

: مضاد للإكتئاب

Fluoxetine cap كبسولة مرة واحدة يومياً

: الجلطة

Clexane 20,40,60,80 40-80u /sc/12h prophylactic 20-40 u / sc /12h

Epilepsy

partial

Simple, complex

Tegretol tab 200, CR100, CR400 Syrup100

<1 y 100- 200 1-5 y 200-400

5-10 y 400-600 10-15y 600- 1000 على مرتين

Generalized

Grand mal, absence, tonic clonic, myoclonic

Depakine 200 tab **depakine chrono** once daily

15 – 30 mg /kg/day

: التهاب الأعصاب

Gaptin 100, 300, 400 cap كبسولة مرة واحدة يومياً

: التبول الليلي

Uripan (tab, syrup) 9LE قرص أو ملعقة عند النوم

Minirin (nasal spray) 103 LE بخة عند النوم مع رفع الرأس

Tofranil (10, 25 tab) 2LE 1-2 قرص قبل النوم

: المهدئة

Buspar 10, 15 (tab) 11 LE 5 مجم (½ قرص) 3 مرات يومياً 3 مرات يومياً

Neuril 2, 5, 10 (tab, amp) 2LE قرص 3 مرات يومياً

Anti fungal

Systemic:

Fungican (1cap) 10LE كبسولة مرة واحدة لفطريات المهبل

Arozole 100 (14 cap) 56 LE *Vulvovaginitis* 200 mg /2 daily/ 7 days

P. versicolor 200 mg / 1daily /7days

Dermato 200mg/ 1daily / 7days

Kizole (10 tab) 18 LE قرص مرة واحدة أثناء الأكل لمدة أسبوع على الأقل

Griseovin (susp) 3 ملاعقة صغيرة 3 مرات يومياً

Topical:

Closol (spray) 6.5 LE *candida* مرتين يومياً

Trosyd (cream , solution for hairy areas) 8LE *tinea*

Fungiban (lamisil) (gel) مرتين يومياً

Daktarin (cream) 6LE

روشتة التينيا:

Griseovin 3 ملاعقة 3 مرات يومياً

Nizoral (curazole H) shampoo مرتين أسبوعياً يوضع على الشعر 10 دقائق

Lamisil (cream) 15 LE

Vaginal:

Gynetrotyd (vaginal tab , cream) مرة واحدة يومياً لمدة 3 أيام ويكرر أن لم يتحسن 3 أيام أخرى

Amrizole N (vaginal supp) *candida* لبوسة مرة واحدة لمدة أسبوعين

Canesten (vag. Tab100 , 500) قرصين في المهبل مرة واحدة لمدة 3 أيام

Betadine (vaginal douch)

Premarin (cream) (estrogen لتقليل أعراض سن اليأس) مرة واحدة لمدة 24 يوم كل شهر

Instead of premarin we can use cidolut nor and can be used to delay menses 1 tab 3 times daily 5 days before

Topical corticosteroid:eczema +itching

Cream → Once daily

Oint → Twice daily

Betnovate (cream , oint) 5LE (high potency)

Betaderm (cream , oint) 2.5LE (intermediate potency)

Locasalen(ointment) 4LE , **diprosalic**(cream 4 LE , lotion 9LE) (CST + Salicylate)

للعلاج الصدفية والأكزيما المستعصية ليس بها كورتيزونات:

When CST is CI as infants , children , pregnancy , DM in long term therapy

Bioclear (lotion , gel) 4 LE مرتين يومياً

Elidel 120LE مرتين يومياً

When infection is superadded:

Quadriderm (cream) 4.5LE مرتين يومياً

Bacterial vaginal infection

Bidalkin powder

كيس على لتر ماء بارد مرتين يومياً

Betadine supp 1x1x7

Amrizole500 tab

قرص 3 مرات بعد الأكل

Ibidroxil cap 1/2/7

Vaginal fungal infection :

Flucoral 150 mg كبسولة أسبوعياً لمدة أسبوعين

Betadine vaginal douch كيس على لتر ماء مرتين

Gynotrotyd vaginal supp 3 مرات يومياً

إلتهاب الحفاض:

Baby quard cream مرتين أو عند تغيير الحفاض

Kenacomb cream 2-1 مرة يومياً

bed sores , skin ulcer:

Rofa gel 27£E

Warts , corns:

Collomack paint 6.5£E مرتين يومياً

Wound healing:

Mebo (cream) 16 £E

Iruxol (oint) 20 £E 1 X 1 X 8W

تشققات الجلد :

Hipanten (cream) 6£E 1X2

Panthenol (cream)

Purelan (cream) تشققات الحلمة

الحروق:

Betadine (solution , oint) 2 £E ليس في الحمل

Dermazine (cream) 3£E

Fucidine (cream , oint) topical antibiotic 1 x 2-3

Sofratull gauz

Topical antiviruses:

Novirus (cream) كل أربع ساعات

Mouth wash:

Betadine MW 3مرات لمدة 3 دقائق

Oracin

Tantum verde

أقراص إستحلاب :

Stripsore 24 loz 10 £E

Tantum verde P 20 Loz 3 £E

Candy 22 loz 15 £E

ZoraC 3 £E

NB: Cream is used for face and wet skin but ointment is used for dry skin

Oral antifungal: Betadine MW 3min/3times +

Daktarin (Oral gel) 18 £E

Miconaz (oral gel) 5£E ½ ملعقة 4 مرات يومياً children / ¼ ملعقة Infant

Fungistatin (oral susp) 4£E

Nystatin (oral drops) 4£E ملعقة في الفم ويشطف ثم يبلع الباقي ولا يؤخذ ماء بعدها أطول فترة ممكنة 4 مرات يومياً

Gonorrhea:

Cefobid vial حقنة واحدة عضل ولا تكرر

Rimactane 300 cap كبسولة كل 8 ساعات لمدة 3 أيام

Urisept قرص 3 مرات بعد الأكل

Oral ulcers :

Salivex - L (Paint) 5LE

Mundisal (gel) 6LE

: ألم الأسنان

Dentocalm (oint) 1.5LE

Intertrigo :

Calamine lotion 3مرات يومياً

+ Betnovate (Quadriderm)

Local analgesis :

Voltarin (gel) 5 LE 1X3

Ketolgin (gel) 3LE 1x3

Felden (gel) 6.5LE CI in pregnancy , lactation

Radian massage cream

Rubralgin (cream) 2LE

: طبيعي للإحتقان

Robb (oint) 3LE

Sunscreen :

Luna 7 lotion 34LE

منع مص الأظافر

No Habit (lotion) 10LE

: الكدمات

Hemoclar (oint) 5.5LE 3X1

Reparil - n (gel) 9LE

Acne : Sacnel (soap) ± oral antibiotic +

Inflammatory :

Acne benz 13.5LE يخلط كمية من الأنبوبتين ثم يدهن مرتين صباحاً ومساءً بعد غسل الوجه بالماء الدافئ

Non inflammatory :

Acne - free 0.25,0.5,0.1 cream 5LE CI IN pregnancy (teratogenic) يوضع مساءً ويغسل صباحاً

: تفتيح لون البشرة

Olay

Fair & lovely

Scar:

Contractubex (gel) 18LE 3مرات يومياً لو hard يظل طوال الليل

رائحة الفم الكريهة:

Betadine MW

Vibramycin cap 1/1/10 after food by 1 h

Amrizole 250 tab 3مرات بعد الأكل

قشر الشعر

1-Curazole H (shampoo) 12LE مرتين اسبوعياً ويترك 5 دقائق

2-Rootage (cream) يوم بعد يوم

مغذى للشعر

Pantene (shampoo)

سقوط الشعر

Hair stabil (shampoo) 10LE يوم بعد يوم

Tonoscalpine (lotion) 9LE يوم بعد يوم علي شعر مبلل

For Hair & Nail (Cap) 9LE كبسولة مرتين يومياً لمدة ثلاث شهور

Scabies :

Eurax (cream , lotion) 6LE مرة واحدة لمدة 3 أيام

Sulphur (soap) يوضع على الجسم ويغسل بليفة خشنة ويتم للبيت كله

القمل

Licid

Eurax

P.resea

Rosagel (gel) مرتين يومياً

للإحتقان

Afrin (drops , spray , ped drops) 3LE 1x2

Otrivin (drops , spray , ped drops) 5LE 1x2

New born : lyse (otrivin baby saline) (drops) 2LE 1x3

Snoring :

Snore no more (nasal spray) 45LE 2 بخة قبل النوم

حساسية الأنف

Nasotal (drops, spray) 6LE 1X3

Eye & ear

Antibiotic :

Terramycin (eye oint) 2LE قبل النوم

Tobralex (oint , drops) 5LE كل 6 ساعات

Sinusitis:

Diprosfos amp حقنة عضل مرة واحدة ولا تكرر

Ciprofar 500 قرص كل 12 ساعة

Clarinase tab قرص كل 12 ساعة chronic

Nasotal spray كل 12 ساعة chronic

Flixonase spray كل 12 ساعة chronic

Cataflam 50 قرص كل 12 ساعة

Acute Allergic rhinitis:

Clarinase tab قرص كل 12 ساعة

Nasotal spray كل 12 ساعة

± antibiotic ± afrin

Ocuflox (drops) 4.5LE 4مرات يومياً لأقل من 10 أيام

Ciprocin (drops, oint) 5LE 4مرات يومياً

corneal ulcer نقطتين كل ربع ساعة أول يوم ثم كل ساعة ثاني يوم ثم كل 4 ساعات ثالث يوم &

otitis externa 3نقط كل أربع ساعات

polyspectran drops 6.5LE 1/4-6h

Trachoma :

Isoptocetamide (drops) 5LE كل ساعتين chronic كل 4 ساعات acute

Decongestant :

Visine (drops) 5LE 3مرات

Prisoline (naphazolin + chlopheneramine (drops) 3LE 3مرات للحساسية والإحمرار

Lubricants :

Liquifilm tears (drops) 2LE

Glaucoma :

Timolol 0.25, 0.5 مرة واحدة

Cosopt 74 LE 1X2

مخدر لعمليات العين مثل الرايش

Benox (drops) 4LE

Allergy :

Opticure (drops) 3مرات

Antibiotic for ear only :

Cidocetin (chloramphenicol) (ear drops) 1 x 3 x 7

Ear Wax & pain :

Ear Cure (drops) 2 x 3

+ Ear wax (drops) 2 x 3 x 3

التهاب الأذن الوسطى والخارجية :

Polyspectran drops 2-1 نقطة 3مرات

Ear cure drops 2-1 نقطة 3مرات يومياً

Bactiolor 500 cap/ 8h/10days

or Curisafe 500 cap كبسولة كل 12 ساعة

Cataflam 50 cap مرتين يومياً

allergex for itching وفي الأذن الخارجية نضيف

First aid in burn :

1st, 2nd degree:

Betadine + dermazine +sofratull

(gauze)+ibidroxil+iruxol+avil

3rd degree:

1 – cannula and Ringer

2 – avil amp + epidron + tetanus(do allergy)

3 – analgesia (nalufin)

4 – eye drops (terramycin)

تم بحمد الله وفضله